

Gießener Monitoring-Schema I zur Beurteilung der Vitalität bis zur 6. Lebensstunde

Modifiziert nach [Unterstab, 2016]

1. Lage und Situation unmittelbar nach der Geburt (1-2 Minuten)

- Kopf Brust-Lage + regelmäßige Atmung (Mundspalt geschlossen) **3**
- Seitenlage + regelmäßige Atmung **2**
- Seitenlage + gestörte Atmung (Mundatmung, unregelmäßige Frequenz) **1**

2. Lage und Situation bis zu 30 Minuten nach der Geburt

- Erste Aufstehversuche **3**
- Verharren in Brust- oder Seitenlage **2**
- Verharren in Brust- oder Seitenlage und Krampfanfälle **1**

3. Lage und Situation bis zu 60 Minuten nach der Geburt

- Sicheres Stehen **3**
- Unsicheres Stehen, häufiges Liegen, Kopf jedoch aufgehoben **2**
- Weiteres Verharren in Liegeposition (Seitenlage, aufgestützter Kopf) **1**

4. Lage und Situation bis zu 120 Minuten nach der Geburt

- Trinken am Euter mit Sauggeräuschen **3**
- Trinken am Euter ohne Sauggeräusche **2**
- Kein Trinken **1**

GESAMT

Gesamtpunktzahl:

12 bis 11 vitales Fohlen

10 bis 9 gefährdetes Fohlen

< 9 hochgradig gefährdetes Fohlen

Download dieses Dokumentes unter:

<https://die-sanften-riesen.de/downloads/>

oder direkt über den QR Code:



Gießener Monitoring-Schema II zur Beurteilung der Vitalität von der 6. bis zur 24. Lebensstunde

1. Stehvermögen

- Vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung **3**
- Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegungen **2**
- Häufiges Liegen, schwerfälliges Aufstehen, unkoordinierte Bewegungen **1**

2. Körpertemperatur

- 38,0 bis 39,0°C **3**
- >39,2°C **2**
- <38,0°C **1**

3. Atmung

- Regelmäßig und gleichmäßig **3**
- Unregelmäßig **2**
- Stoßweise flach, geblähte Nüstern **1**

4. Darmpechabgang (Mekoniumabgang)

- Normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot **3**
- Geringe Menge, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe **2**
- Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe, Liegen und Wälzen **1**

5. Harnabsatz

- Normal mehrfach im Strahl, nach der Geburt in genügender Menge **3**
- Häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen **2**
- Kein Harnabsatz trotz häufiger Harnabsatzhaltung **1**

6. Kontakt mit Muttertier

- Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Sauggeräuschen **3**
- Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euterkontakt **2**
- Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters **1**

GESAMT

Gesamtpunktzahl:

18 vitales Fohlen

17 bis 15 gefährdetes Fohlen

< 15 hochgradig gefährdetes Fohlen

Download dieses Dokumentes unter:

<https://die-sanften-riesen.de/downloads/>

oder direkt über den QR Code:

